

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 27 sierpnia 2021 r. (poz. 1592)

## WZÓR

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA PRODUKTY KRWIPOCHODNE, Z WYŁĄCZENIEM IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD, REKOMBINOWANE KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA ORAZ DESMOPRESYNĘ<sup>1)</sup>

.....  
oznaczenie podmiotu leczniczego

Imię i nazwisko pacjenta: .....

Numer PESEL pacjenta<sup>2)</sup>: .....

Data urodzenia pacjenta (dd-mm-rrrr):   -   -

Karta postępowania wystawiona  TAK  NIE

przez ośrodek leczenia hemofilii termin następnej aktualizacji karty:

i pokrewnych skaz krwotocznych:   -   -

**Rodzaj skazy krwotocznej oraz postać:**

hemofilia A  ciężka  umiarkowana  łagodna

hemofilia B  ciężka  umiarkowana  łagodna

nabyta hemofilia A

choroba von Willebranda  typ 1  typ 2  typ 3

nabyty zespół von Willebranda

niedobory fibrynogenu

niedobór protrombiny

niedobór czynnika V

niedobór czynnika VII (hypoprokonwertynemia)

niedobór czynnika X

niedobór czynnika XI

niedobór czynnika XIII

złożony niedobór czynnika V i czynnika VIII

<sup>1)</sup> Wydruk zamówienia indywidualnego wypełnionego w internetowym systemie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę może zawierać wyłącznie pola zaznaczone przez lekarza określające rodzaj skazy krwotocznej i rodzaj produktu leczniczego wybranego przez lekarza wraz ze wskazaniem do jego podania.

<sup>2)</sup> W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

- złożony wrodzony niedobór czynnika II, czynnika VII, czynnika IX i czynnika X
- obecność inhibitora fibrynogenu, czynnika II, V, VII, X, XI lub XIII (allo- lub autoprzeciwciał)
- trombostenia Glanzmanna
- zespół Bernarda-Souliera
- inne wrodzone trombocytopatie
- nosicielka hemofilii A i B z graniczną aktywnością czynnika VIII lub IX oraz dodatnim wywiadem krwotocznym
- graniczna aktywność czynnika von Willebranda oraz dodatni wywiad krwotoczny
- inne\*

\* podać jakie: .....

**Obecność inhibitora:**

- niskie maksymalne miano (do 5 jednostek Bethesda włącznie)
- wysokie maksymalne miano (powyżej 5 jednostek Bethesda)
- w trakcie diagnostyki

**Zalecana ilość czynnika krzepnięcia / desmopresyny: .....**

(określona na podstawie masy ciała pacjenta, która wynosi ..... kg)

- koncentrat czynnika VIII
- koncentrat rekombinowanego czynnika VIII
- koncentrat czynnika IX
- koncentrat rekombinowanego czynnika IX
- koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda
- koncentrat aktywowanych czynników zespołu aPCC
- koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC
- koncentrat czynnika VII

- desmopresyna dożylna
- desmopresyna donosowa
- koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa
- koncentrat fibrynogenu
- koncentrat czynnika XIII
- koncentrat wieprzowego rekombinowanego czynnika VIII (rpFVIII)

### **Wskazania do wydania koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny**

#### 1. Koncentrat czynnika VIII

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie domowe – program ITI
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

#### 2. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII<sup>3)</sup>

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie domowe – program ITI
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

#### 3. Koncentrat czynnika IX

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie domowe – program ITI
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

---

<sup>3)</sup> Do leczenia krwawień u pacjentów z hemofilią A, którzy nie otrzymywali wcześniej koncentratu osoczopochodnego czynnika VIII, w przypadku osób dorosłych są wymagane weryfikacja przez lekarza z ośrodka leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz wydanie opinii i ostateczna kwalifikacja przez Radę Programu, o której mowa w programie polityki zdrowotnej dotyczącym leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych przyjętym przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

4. Koncentrat rekombinowanego czynnika IX<sup>4)</sup>

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie domowe – program ITI
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 5. Koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda, zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia choroby von Willebranda

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie domowe – program ITI
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 6. Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC)

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 7. Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC)

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

---

<sup>4)</sup> Do leczenia krwawień u pacjentów z hemofilią B, którzy nie otrzymywali wcześniej koncentratu osoczopochodnego czynnika IX, w przypadku osób dorosłych są wymagane weryfikacja przez lekarza z ośrodka leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz wydanie opinii i ostateczna kwalifikacja przez Radę Programu, o której mowa w programie polityki zdrowotnej dotyczącym leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych przyjętym przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## 8. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 9. Koncentrat czynnika VII

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 10. Koncentrat fibrynogenu

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 11. Koncentrat czynnika XIII

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 12. Desmopresyna dożylna

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

## 13. Desmopresyna donosowa

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne



## 14. Wieprzowy rekombinowany czynnik VIII (rpFVIII)

- leczenie domowe – krwawienia
- leczenie domowe – profilaktyka
- leczenie ambulatoryjne
- leczenie szpitalne

.....  
data

.....  
oznaczenie<sup>5)</sup> i podpis lekarza

<sup>5)</sup> Oznaczenie zawiera: imię, nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu oraz specjalizację, jeżeli dotyczy.